TD pathologie des principales infections : Deuxième partie : les infections parasitaires.

Dr H BOUAKLINE

Avril 2020

Objectifs

Savoir reconnaitre macroscopiquement et/ou microscopiquyement (coloration HE ou colorations spéciales) les principaux parasites : *Pneumocystis jiroveci (carinii), Candida, Aspergillus et mucormycose, Cryptococcus neoformans, Coccidioides immitis,* Histoplasmose, *Toxoplasma gondii, Cryptosporidium parvum*, *Plasmodium, Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiuria,Wuchereria bancrofti, Sarcoptes scabiei,* Pediculus humanis capitis et Phthirus pubis

Plan du TD

Plan du TD

I/ Pneumocystis jiroveci (carinii)

II/ Candida

III/ Aspergillus et mucormycose

IV/ Cryptococcus neoformans

V/Coccidioides immitis

VI/ Histoplasmose

VII/*Toxoplasma gondii*

VIII/ Cryptosporidium parvum : la cryptosporidiose.

IX/ *Plasmodium*

X/ Ascaris lumbricoides

XI/ Trichuris trichiuria

XII/ microfilaires : *Wuchereria bancrofti*

*XIII/*acarien de la gale : *Sarcoptes scabiei*

XIV/ Pediculus humanis capitis et Phthirus pubis

I/ *Pneumocystis jiroveci (carinii)*

Ce poumon est aussi solide que le foie à cause de la *pneumonie à Pneumocystis jiroveci (carinii) PPC*. La PPC est typique des patients immunodéprimés, en particulier ceux atteints du VIH / SIDA. *Pneumocystis jiroveci* possède un ADN similaire aux champignons, mais produit cliniquement une maladie similaire à un parasite unicellulaire.



En y regardant de plus près, la surface du poumon atteint d'une *pneumonie* à *Pneumocystis jiroveci (carinii)* (PPC) a une apparence rose saumon en raison de la nature diffuse du processus infectieux. La fièvre, la toux non productive et la dyspnée sont les symptomes habituels.



Au microscope, chaque alvéole est remplie d'exsudat rose granulaire dans ce cas de *pneumonie à Pneumocystis carinii (jirovecii)* (PPC). Cela réduit l'échange d'oxygène et conduit à la dyspnée et à la toux caractéristiques du PPC.



À un grossissement plus élevé, l'exsudat rose granuleux de la *pneumonie à Pneumocystis carinii (jirovecii)* est observé. L'exsudat se compose de liquide d'œdème , de protéines, d' organismes *Pneumocystis* et de macrophages morts. C'est la raison pour laquelle les échanges gazeux sont gravement compromis.





La meilleure façon de poser le diagnostic de *pneumonie à Pneumocystis jiroveci (carinii)* consiste à effectuer une coloration à la méthénamine argent (GMS) de Gomori sur le tissu pulmonaire ou du liquide de lavage broncho-alvéolaire (BAL). Les organismes apparaissent sous forme de balles de ping-pong écrasées, ou ont une forme en croissant, ou de sphères pliées, ou de balles de plage aplaties ou de balles de tennis dégonflées. Un diagramme de cette apparence est présenté à droite

II/ Candida



Les cellules en herbe avec des pseudohyphaes observées ici sont caractéristiques de l' infection à *Candida*





Avec une coloration PAS, les cellules en herbe et les pseudohyphaes (filaments courts qui ne sont pas de véritables hyphes) de *Candida se* colorent en rouge vif. Une représentation schématique de cet organisme est présentée à droite.



Voici une coloration GMS de *Candida* avec les organismes se colorant en noir. Les différentes espèces sont morphologiquement similaires et varient quelque peu en virulence.

La candidose buccale est courante chez les hôtes (patients) immunodéprimés, tels que ceux infectés par le VIH. IC'est ce qu'on appelle le "muguet buccal"



Une coloration PAS révèle les de couleur violette et les pseudohyphaes de *Candida* à la surface de la langue. La candidose a tendance à être limitée aux surfaces épithéliales et est rarement invasive pour les tissus sous-jacents.

III/ Aspergillus et mucormycose



Il s'agit d'un abcès fongique du poumon. Remarquez le matériau de bronzage jaune dans l'abcès. C'est un matériau très ferme, car il est composé d'hyphes fongiques. Celui-ci est dû à *Aspergillus* . *Les* organismes *Aspergillus* o nt l'habitude de coloniser les cavités pulmonaires précédemment formées, telles que celles résultant d' *une* infection à *Mycobacterium tuberculosis*

Il s'agit d'une infection pulmonaire à *Aspergillus* . Notez comment l'infection traverse la plèvre entre les lobes. Notez qu'une petite artère pulmonaire (flèche bleu) à gauche de l'abcès fongique jaune-brun est thrombosée et entourée d'hémorragie. *Les* hyphes fongiques *Aspergillus* aiment envahir les vaisseaux et les tissus environnants.



Voici une boule de champignon *Aspergillus* dans une bronche dilatée. Cet organisme peut coloniser des poumons anormaux endommagés par une maladie antérieure, comme une tuberculose ou une bronchectasie. Il existe plusieurs espèces d' *Aspergillus* et elles ont une apparence morphologique similaire à la microscopie.





À un grossissement plus élevé, les hyphes d' *Aspergillus* se ramifient. Une représentation schématique de cet organisme est présentée ci-dessous, par rapport à *Mucor* avec des hyphes plus larges et non cloisonnés



Voici des rameaux d' *Aspergillus* hyphes.



Les hyphes larges et non cloisonnés observés ici sont caractéristiques de *Mucor* . Il existe plusieurs espèces de zygomycètes, toutes désignées collectivement comme la cause de la mucormycose. Comme dans ce cas, le cadre de l'infection était le nasopharynx chez un patient atteint de diabète sucré. L'acidocétose potentialise la croissance de cet organisme dans les tissus.

IV/ *Cryptococcus neoformans*



Il s'agit d'une infection pulmonaire à *Cryptococcus neoformans* . Il existe de nombreux organismes qui ont une grande capsule mucoïde, donnant l'apparence d'une zone claire autour d'un noyau rond et faible. Passez la souris sur la boîte ci-dessous pour voir un organisme cryptococcique avec un noyau central et une grande capsule mucoïde.





Il s'agit d'une méningite à *Cryptococcus neoformans* colorée au GMS. Ce patient est atteint de SIDA. Les cellules en herbe de *Cryptococcus* ont une base étroite. Une représentation schématique de cet organisme est présentée ci-dessous



Il s'agit d'une préparation à l'encre de Chine de liquide céphalorachidien chez un patient atteint de méningite à *Cryptococcus neoformans* . Notez la zone claire de la capsule autour du noyau central des organismes. Au microscope, cette apparence peut être difficile à distinguer des leucocytes. Le test sérologique pour l'antigène cryptococcique est un test à haute sensibilité.

V/ *Coccidioides immitis*





Ces grosses sphérules à paroi épaisse et remplis d'endospores sont caractéristiques des *Coccidioides immitis*. Notez comment la sphérule de gauche éclate pour expulser ses endospores, qui se développent et continuent l'infection. Une représentation schématique de cet organisme est présentée ci-dessous



Cette infection pulmonaire est due à la coccidioïdomycose, comme en témoignent les deux grosses sphérules remplies d'endospores. Voici la phase de levure avec infection. Dans l'environnement, *Coccidioides se* développe en phase de moisissure sous forme d'arthrospores alternées.

VI/ Histoplasma capsulatum : histoplasmose

De nombreuses infections fongiques peuvent produire un motif granulomateux d'inflammation dans les tissus. Chez les hôtes immunodéprimés, la réponse immunitaire est souvent médiocre, de sorte que les granulomes sont mal formés, voire pas du tout. Cette partie du foie présente des granulomes de couleur jaune pâle (flèche bleu) chez un patient atteint d'histoplasmose disséminée.





Il s'agit d'une infection à *Histoplasma capsulatum* . Notez comment chaque macrophage est rempli de nombreux petits organismes (flèche bleu) . Les organismes ont une zone claire autour d'un noyau bleu central qui donne à la membrane cellulaire l'apparence d'une capsule. D'où le nom de l'organisme. Une représentation schématique de cet organisme est présentée ci-dessous.



Une coloration au PAS met en évidence une infection à *Histoplasma capsulatum* dans le foie.

VII/ *Toxoplasma gondii*



Il s'agit d'un pseudokyste de *Toxoplasma gondii* dans le myocarde d'un patient atteint du SIDA. La toxoplasmose est une infection opportuniste des adultes immunodéprimés. Il peut également s'agir d'une infection congénitale.

Il s'agit d'un abcès de *Toxoplasma gondii* dans le cerveau, qui apparaîtrait comme une lésion améliorant l'anneau en imagerie radiologique avec un scanner.



Une biopsie cérébrale révèle des kystes de *Toxoplasma gondii* dans un amas microglial et une variété de types de cellules inflammatoires chez un patient atteint du SIDA.

VIII/ Cryptosporidium parvum : la cryptosporidiose.

Les **petits organismes bleus (flèche)** alignés le long de la bordure en brosse du petit épithélium intestinal sont des organismes *Cryptosporidium parvum* provoquant la cryptosporidiose. Cette infection peut provoquer une diarrhée légère chez les personnes immunocompétentes mais une maladie plus grave chez les hôtes immunodéprimés.

.



L' infection à *Cryptosporidium parvum* est mieux diagnostiquée par examen des selles. Trois **kystes** (flèche) de *Cryptosporidium parvum* apparaissent ici dans les selles avec une coloration acide rapide.

IX/ Plasmodium



Ce frottis sanguin périphérique provient d'un patient atteint de paludisme. Cette infection est due à *Plasmodium vivax* . À la flèche se trouve un GR avec un parasite paludéen en forme d'anneau.Trois autres globules rouges dans ce frottis sont également infectés par un trophozoïte annulaire.

X/ *Ascaris lumbricoides*

Il s'agit d'une boule de vers *Ascaris lumbricoides* retirés du côlon d'un adulte. Il s'agit d'une infection grave. Le plus souvent ils produisent une maladie minimale chez la plupart des personnes infectées.

XI/ *Trichuris trichiuria*



Cette surface muqueuse colique est érythémateuse en raison de l'énorme infestation par les organismes *Trichuris trichiuria* (trichures). Une forte infestation de ces helminthes peut entraîner une colite avec hémorragie

XII/ microfilaires : *Wuchereria bancrofti*

Voici les microfilaires. Ces petits vers circulent dans le sang. Il existe plusieurs espèces aux caractéristiques cliniques légèrement différentes, mais elles se propagent par les moustiques. Ces microfilaires se trouvent être des ***Wuchereria bancrofti*****.**

XIII/ acarien de la gale : *Sarcoptes scabiei*



Ceci est un acarien de la gale. Le nom officiel est *Sarcoptes scabiei* . Ces petites bestioles creusent dans l'épiderme, généralement sur les mains mais parfois ailleurs sur les plis comme les aisselles, et produisent des démangeaisons le long des terriers linéaires. Ces lésions sont souvent excoriées à cause des démangeaisons.

XIV/ Les poux : Pediculus humanis capitis et Phthirus pubis)

De petits poux bruns de la taille d'une graine de sésame sont éparpillés parmi les cheveux. Les poux des cheveux sont relativement courants, en particulier chez les enfants, et peuvent provoquer des démangeaisons, parfois jusqu'à l'excoriation avec risque d'infection secondaire. Les poux et leurs œufs peuvent facilement être transmis d'une personne à une autre en contact étroit ou en partageant des peignes, des serviettes, etc.



Les poux sont des arthropodes de la classe Insecta qui habitent généralement les cheveux et mordent l'hôte humain pour un repas de sang. À gauche, le pou de tête (Pediculus humanis capitis) et à droite, le pou du crabe (pubien) (Phthirus pubis)

Référence bibliographique principale

https://webpath.med.utah.edu/INFEHTML/INFECIDX.html#3

MERCI POUR VOTRE ATTENSION

BON COURAGE

PRENEZ SOINS DE VOUS

AU PLAISIR DE SE REVOIR

- DR H BOUAKLINE ; HMRUOran
- EMAIL / fatihoussam@live.com