TD pathologie vasculaire
topo spécial sur l'infarctus du myocarde

DR H BOUAKLINE

Avril 2020

Objectifs du TD

- Décrire une artère coronaire normale.
- Connaître les facteurs de risques de l'athérosclérose.
- Décrire et reconnaitre les différentes lésions macroscopiques et microscopiques de l'athérosclérose débutante, avancée et compliquée.
- Décrire et reconnaitre une artériolosclérose hyperplasique.
- Décrire et reconnaitre une nécrose fibrinoïde touchant une petite artère consécutive à la maladie hypertensive.
- Décrire et reconnaitre une artériolosclérose hyaline observée chez les patients atteints de diabète sucré et d'hypertension : décrire une glomérulosclérose nodulaire.
- Décrire et reconnaitre une sclérose calcique médiale de Monckeberg.
- Connaitre le trajet d'un embole veineux depuis une veine profonde jusqu'aux poumons.
- Reconnaitre macroscopiquement et microscopiquement un thrombo-embole pulmonaire sur une pièce de pneumonectomie au cours d'une autopsie.
- Décrire et reconnaitre un infarctus pulmonaire, intestinal, cardiaque, et splénique.
- Connaitre la description en microscopie électronique d'une plaquette.
- Décrire et reconnaitre une hémorragie pétéchiale (exemple de l'hémorragie pétéchiale observée sur l' épicarde).
- Décrire et reconnaitre une ecchymose.
- Décrire et reconnaitre un hématome.
- Reconnaitre microscopiquement une coagulation intra-vasculaire disséminée.

Plan du TD

1- l'athérosclérose des artères coronaires :

2- l'athérosclérose de l'aorte :

3- l'artériosclérose

4- thrombo-embolie

5- les infarctus

6- les troubles de la coagulation

7- topo sur l'infarctus du myocarde

1- Athérosclérose des Artères coronaires



Il s'agit d'une artère coronaire normale sans athérosclérose : **lumière largement béante** qui peut transporter autant de sang que le myocarde en a besoin. Il n'y a aucun obstacle à la circulation sanguine.



Les facteurs de risque d'athérosclérose sont schématisés ici en relation avec les mécanismes qui favorisent le développement et la formation d'athérome artériel. L'athérosclérose est un processus potentiellement réversible. Le processus d'inversion peut être résumé comme suit: manger moins de calories totales et faire plus d'exercice.



Il s'agit d'une athérosclérose coronaire légère. Quelques plaques lipidiques jaunâtres (flèche) éparses sont visibles sur la surface intimale de l'artère coronaire ouverte traversant la surface péricardique d'un cœur. Le degré d'athérosclérose ici n'est pas suffisamment important pour provoquer une maladie, mais pourrait être le signe avant-coureur d'une athérosclérose compliquée à venir.

Le degré d'athérosclérose est beaucoup plus élevé dans cette artère coronaire et la lumière ( )est rétrécie de moitié. Une petite zone de calcification (flèche) est visible dans la plaque à droite

Ces coupes transversales de l'artère coronaire inter-ventriculaire antérieure montrant une athérosclérose plus prononcée avec un rétrécissement à gauche, qui est la partie proximale de cette artère. L'athérosclérose est généralement plus prononcée au début d'une artère où la turbulence du flux vasculaire est plus importante provoquant des lésions endothéliales initiatrices de l'athérosclérose.



Il s'agit d'une plaque athéromateuse dans une artère coronaire qui montre une dénudation endothéliale avec perturbation et formation de **thrombus** (flèche bleu) sus-jacente à droite. Le **média** (flèche rouge) artériel est à gauche. Notez les **cristaux de cholestérol** (flèche verte) et les **lipophages (flèche jaune)** dans le cadre de ce processus athéromateux.



Voici l'athérosclérose coronaire occlusive. La coronaire à gauche est rétréci de 60 à 70%. La coronaire à droite est encore pire avec des preuves de thrombose antérieure avec organisation du thrombus et re-canalisation de sorte qu'il reste trois petites lumières, dont l'une contient des **thrombus (flèche)** récents supplémentaires.

Il s'agit de l'aspect macroscopique d'une athérosclérose coronarienne sévère, qui touche pratiquement 100% de la surface de cette artère coronaire. Il y a une calcification importante, surtout à droite où la lumière est **rétrécie** (flèche)



Voici une artère coronaire avec des plaques athéroscléreuses. Il y a une **hémorragie** (flèche) récente dans la plaque. C'est l'une des complications de l'athérosclérose. Une telle hémorragie pourrait rétrécir de façon aiguë la lumière et produire un syndrome coronarien aigu avec ischémie et / ou infarctus du myocarde



Voici la surface antérieure du cœur avec l'artère coronaire inter-ventriculaire antérieure (descendante antérieure gauche) ouverte longitudinalement. Il s'agit de la thrombose coronarienne, l'une des complications de l'athérosclérose. **Le thrombus occlusif rouge foncé** (flèche) est visible dans la lumière de l'artère coronaire. Cela produit un syndrome coronarien aigu



Voici une vue rapprochée de l'apparence macroscopique d'une thrombose coronaire. Le **thrombus (flèche)** obstrue la lumière et produit une ischémie et / ou un infarctus du myocarde. L'athérosclérose est un processus continu qui prend des années à des décennies avant l'apparition de problèmes cliniquement apparents.



Une **thrombose (flèche)** coronaire est observée au microscope occlus la petite lumière restante de cette artère coronaire. Une telle thrombose coronarienne aiguë est souvent l'antécédent d'un infarctus aigu du myocarde

Le septum interventriculaire du cœur a été sectionné pour révéler un infarctus aigu du myocarde. Le muscle mort est **jaune clair (flèche bleu)** avec une **bordure hyperhémique** (flèche rouge) environnante

Cette coupe transversale à travers le cœur révèle un grand infarctus du myocarde impliquant la paroi ventriculaire antérieure gauche et le septum. L'infarctus commence à guérir, mais a toujours un **centre nécrotique** (flèche). La fraction d'éjection du ventricule gauche serait considérablement réduite.



Les zones jaunâtres claires à blanches des cicatrices myocardiques vues depuis la surface endocardique représentent ici un infarctus du myocarde guéri à distance. Cet infarctus cicatrisé est plus visible sur le **septum** (flèche bleu) mais implique également le **ventricule gauche** (flèche orange)



Il y a eu un infarctus du myocarde transmural étendu antérieur impliquant la paroi libre du ventricule gauche. Notez que l'épaisseur de la paroi myocardique est **normale en** haut (flèche bleu) , mais en bas n'est qu'une **mince paroi fibreuse (flèche orange)** . La zone amincie représente un anévrisme ventriculaire qui s'est développé à la suite de l'infarctus cicatrisé. Un tel anévrisme représente un tissu non contractile qui réduit le volume systolique et tend le myocarde restant. La stase du sang dans l'anévrisme prédispose à la thrombose murale

2- Atherosclerose de l’Aorte



Les **stries lipidiques** (flèche) jaune pâle dans l'aorte sont la première lésion de l'athérosclérose. Presque tout le monde en a et, à eux seuls, ils ne provoquent pas de maladie. Ce sont des lésions précurseurs d'une athérosclérose plus sévère si les facteurs de risque de formation d'athérome persistent.



Aorte ouverte. La flèche blanche indique la strie lipidique la plus importante de cette image, mais il existe d'autres stries lipidiques dispersées sur la surface aortique. Les stries lipidiques sont les premières lésions observées avec l'athérosclérose dans les artères. L'augmentation du cholestérol total et la diminution du cholestérol HDL contribuent à ce processus.

Trois aortes démontrent une athérosclérose légère, modérée et sévère de bas en haut.



Au microscope, la plaque athéromateuse sur cette image est plus épaisse que le reste de la média visible à droite (flèche orange) . La plaque contient une matière rose amorphe avec des « cristaux de cholestérol" en forme de fente de matière lipidique. Il y a **une hémorragie récente** sus-jacente à gauche (flèche bleu) . Un thrombus peut se former au-dessus d'une telle plaque



À un grossissement plus élevé, de nombreux lipophages (flèche jaune) (macrophages remplis de matière lipidique) et des cristaux **de cholestérol** (flèche bleu) sont observées dans cette plaque d'athérome.



Les **cristaux de cholestérol** (flèche bleu) composées de lipides, ainsi que quelques **lipophages** (flèche jaune) dispersées dérivées de macrophages, et de quelques lymphocytes sont observées à fort grossissement dans cette plaque athéromateuse



L'athérosclérose peut affaiblir la paroi de l'aorte au point de se gonfler pour former un **anévrisme (flèche)** . Un anévrisme aortique athérosclérotique se produit généralement dans la partie abdominale sous les artères rénales, comme indiqué ici, mais des anévrismes peuvent se former dans l'aorte la plus proximale ainsi que dans les branches de l'aorte. Les anévrismes aortiques de plus de 5 à 7 cm de diamètre sont plus susceptibles de se rompre.



L'athérosclérose peut impliquer des artères périphériques, en particulier la jambe, à partir des artères iliaques et s'étendant aux artères fémorales, poplitées et inférieures de la jambe. Ici, l'angiographie CT est une **occlusion de l'artère poplitée droite (flèche bleu)**. Il y a ruissellement dans une **branche artérielle collatérale (flèche rouge)**. Les complications incluent une tolérance réduite à l'exercice, de la douleur et des changements ischémiques qui peuvent aboutir à une nécrose gangreneuse

3- Arteriosclerose



Il s'agit d'un type d'artériosclérose différent. Il s'agit d'une artériolosclérose hyperplasique, qui apparaît le plus souvent dans les reins chez les patients présentant une urgence hypertensive (hypertension maligne) lorsque la pression systolique est ≥180 et / ou la pression diastolique ≥120 mmHg avec des signes de lésions aiguës ou continues des organes terminaux. La **paroi artériolaire** (flèche bleu) est nettement épaissie et la **lumière (flèche rouge)** est rétrécie. L'artériosclérose, ou «durcissement des artères» est un terme générique qui inclut l'athérosclérose, l'artériolosclérose et la sclérose calcique médiale.



Parfois, les petites artères et artérioles peuvent être si gravement endommagées en cas d'urgence hypertensive qu'elles présentent une **nécrose ressemblant à de la fibrine (flèche)** qui donne son nom à ce processus - la nécrose fibrinoïde.



Il s'agit de l'artériolosclérose hyaline, qui peut être observée chez les patients atteints de diabète sucré et d'hypertension. Ce glomérule coloré au PAS présente **des dépôts nodulaires** (flèche bleu) de matière amorphe (glomérulosclérose nodulaire). Adjacent à ce glomérule se trouve une **artériole épaissie** (flèche rouge) avec une lumière rétrécie par de l'artériolosclérose hyaline.



Il s'agit de la sclérose calcique médiale de Monckeberg, qui est la forme d'artériosclérose la plus insignifiante (l'athérosclérose et l'artériolosclérose sont certainement significatives). Notez les **calcifications bleu violacé** (flèche) dans les médias; notez que la lumière n'est pas affectée par ce processus. Ainsi, il n'y a généralement pas de réelles conséquences cliniques. Rappelez-vous ce processus lorsque des artères musculaires calcifiées apparaissent sur une radiographie de la région pelvienne chez une personne âgée.

4- Thrombo-embolie



Un thromboembole pulmonaire se déplace d'une grosse veine de la jambe jusqu'à la veine cave inférieure, en passant par le côté droit du cœur et jusqu'aux principales artères pulmonaires au fur et à mesure qu'elles se ramifient. Ces thrombus s'embolissent le plus souvent à partir de grosses veines des jambes et du bassin où des thrombus peuvent se former avec stase et / ou inflammation.



le tronc pulmonaire et les bronches droite et gauche des artères pulmonaires sont vues ici ouvertes pour montrer un gros thromboembole.

Voici un autre
gros **thromboembole** pulmonaire vu en coupe transversale de ce poumon. La source typique de ces thromboemboles provient de grosses veines des jambes et du bassin.
Les embolies pulmonaires peuvent être classées par taille comme petites, moyennes et grandes. Les petits peuvent être cliniquement inapparents. Ceux de taille moyenne peuvent ne pas tuer le patient, mais peuvent entraîner un infarctus pulmonaire. Les gros peuvent mettre la vie en danger. L'embolisation pulmonaire récurrente peut réduire le débit vasculaire pulmonaire et provoquer une hypertension pulmonaire.

Ce **thromboembole** (flèche) pulmonaire obstrue l'artère pulmonaire principale. Les personnes immobilisées pendant des semaines sont les plus à risque. Le patient peut ressentir une dyspnée soudaine. La mort peut survenir en quelques minutes.

Il s'agit de l'apparence microscopique d'une embolie pulmonaire (EP) dans une branche artérielle pulmonaire majeure. La superposition des globules rouges et de la fibrine rose plus claire emmêlant les leucocytes et les plaquettes s'est produite dans la veine dans laquelle le thrombus s'est formé à l'origine.



Cette embolie pulmonaire adhère à la **paroi artérielle pulmonaire** . Si le patient survit, le thromboembole s'organisera et, pour la plupart, sera retiré.



Ce sont des « stries de Zahn" qui sont l'alternance de bandes rose pâle de plaquettes avec de la fibrine et des bandes rouges de globules rouges formant un véritable thrombus

5- les Infarctus



L'occlusion des artères pulmonaires principales peut tuer subitement le patient. L'occlusion de petites artères pulmonaires n'a pas d'effet immédiat majeur. L'occlusion d'une branche de l'artère pulmonaire de taille moyenne peut entraîner un **infarctus** **(flèche)** pulmonaire chez une personne dont l'état cardiaque ou respiratoire est compromis. **Un infarctus pulmonaire est hémorragique** en raison de la double circulation sanguine.

Un infarctus hémorragique peut être observé dans des endroits où un flux collatéral peut se produire, comme dans l'intestin, montré ici à l'autopsie avec un intestin grêle ischémique rouge foncé. Habituellement, il est difficile d'infarcter l'intestin grêle ou le gros intestin, en raison d'un apport sanguin anastomosant important. En règle générale, un compromis sévère d'au moins 2 des 3 principales sources artérielles (tronc coeliaque, mésentérique supérieur, mésentérique inférieur) est nécessaire pour que l'infarctus se produise. Un tel compromis artériel est plus susceptible de se produire avec une athérosclérose sévère (souvent avec un diabète sucré) et avec une vascularite (comme avec la polyartérite noueuse classique). Bien sûr, une insuffisance cardiaque avec hypotension sévère peut produire un résultat similaire

L'infarctus du cerveau peut résulter d'une thrombose, bien que la plupart des cas surviennent après une embolisation, impliquant des artères cérébrales, souvent le trigone de Willis. L'infarctus cérébral entraîne généralement une nécrose liquéfiante, comme le montre le début de la résolution kystique de l'infarctus.



L'infarctus de nombreux organes internes entraîne un infarctus « blanc" de la perte de l'apport sanguin, entraînant une nécrose coagulative. On voit ici un infarctus du myocarde par occlusion d'une artère coronaire majeure, ici l'artère interventriculaire antérieure (antérieure gauche descendante)



L'infarctus de nombreux organes internes conduit à un infarctus « blanc" avec une apparence grossière en forme de coin (conique en 3 dimensions) résultant de l'occlusion d'un apport sanguin ramifié. Voici les infarctus spléniques chez un patient atteint d'endocardite infectieuse. Des parties des végétations se sont embolisées dans la rate. Ces infarctus sont typiques des infarctus ischémiques: ils ont une base sur la capsule, pâles et en forme de coin. Le parenchyme splénique restant apparaît en rouge foncé.

6- les troubles de la Coagulation



Voici une micrographie électronique réelle d'une plaquette. Notez que cette plaquette a une ressemblance frappante avec un cookie aux pépites de chocolat (à titre de comparaison, les cookies aux pépites de chocolat sont présentés ci-dessous). Les pépites de chocolat sont les granules alpha et denses qui contiennent une variété de médiateurs tels que l'ADP. Lorsqu'elles sont activées, les plaquettes libèrent leurs granules pour favoriser la coagulation, changer de forme et devenir collantes pour s'agréger et boucher les petits trous vasculaires

Voici les hémorragies pétéchiales observées sur le péricarde. Les pétéchies (hémorragies ponctuelles) représentent des saignements de petits vaisseaux et sont classiquement trouvées lorsqu'une coagulopathie est due à une faible numération plaquettaire. Ils peuvent également apparaître suite à une hypoxie soudaine.

Les zones hémorragiques tachées de la peau sont appelées **ecchymoses**. Les ecchymoses sont plus grandes que les **pétéchies**. Entre les deux, il y a des hémorragies appelées **purpura**. Les termes ecchymose et purpura sont souvent utilisés de manière interchangeable. Ils peuvent apparaître avec des troubles de la coagulation. Dans le cadre de tissus normaux soumis à un traumatisme contondant suffisant pour rompre les petits vaisseaux sanguins et produire des saignements des tissus mous, le processus serait appelé **contusion.**

Une collection localisée de sang à l'extérieur du système vasculaire dans les tissus est connue sous le nom **d'hématome**. Voici un **petit hématome sous l'ongle** après un traumatisme, qui a une apparence bleuâtre à cause du sang désoxygéné qu'il contient.

La coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) est une conséquence de l'activation généralisée du système de coagulation par une lésion endothéliale et / ou la libération de substances thromboplastiques dans la circulation. **La CIVD peut être observé avec des infections graves, des traumatismes, des néoplasies et des complications obstétricales**, entre autres. De petits thrombus de fibrine peuvent se former dans de petites artères du cerveau, du cœur, des poumons, des reins et d'autres organes pour provoquer des lésions ischémiques des tissus



De petits thrombus de **fibrine** provenant d'une activation généralisée du système de coagulation avec une coagulopathie intravasculaire disséminée (CIVD) peuvent être observés dans les boucles capillaires de ce glomérule, mis en évidence par une coloration de fibrine. Les résultats de laboratoire avec une CIVD incluent une diminution des plaquettes, une diminution du fibrinogène, un temps de prothrombine prolongé, un temps de thromboplastine partiel élevé et un D-dimère élevé. La consommation de facteurs de coagulation avec la génération de produits de scission de fibrine, ainsi que la consommation de plaquettes, conduit à ces résultats

6- Topo sur l’infarctus du myocarde

Qu'est-ce que la cardiopathie ischémique?

La cardiopathie ischémique est causée par un déséquilibre entre le flux sanguin myocardique et la demande métabolique du myocarde. La réduction du débit sanguin coronaire est liée à l'athérosclérose progressive avec une occlusion croissante des artères coronaires. Le débit sanguin peut être encore diminué par des événements superposés tels que le vasospasme, la thrombose ou les changements circulatoires conduisant à une hypoperfusion. (Anversa et Sonnenblick, 1990).

Les facteurs qui réduisent le flux sanguin coronaire comprennent:

- Diminution de la pression diastolique aortique
- Augmentation de la pression intra-ventriculaire et de la contraction myocardique
- Sténose de l'artère coronaire, qui peut être subdivisée en outre dans les étiologies suivantes:
  - Sténose coronaire fixe
  - Changement aigu de la plaque (rupture, hémorragie)
  - Thrombose de l'artère coronaire
  - Vasoconstriction
- Sténose valvulaire aortique et régurgitation
- Augmentation de la pression auriculaire droite

Mécanisme

- Des vaisseaux collatéraux de 40 microns sont présents dans tous les cœurs avec des gradients de pression permettant l'écoulement, malgré l'occlusion des principaux vaisseaux. **En général, la section transversale de la lumière de l'artère coronaire doit être réduite de plus de 75% pour affecter de manière significative la perfusion**. L'athérosclérose coronaire est diffuse (impliquant plus d'une branche artérielle principale) mais est souvent segmentaire, et implique généralement les 2 cm proximaux des artères (épicardiques). (Anversa et al, 1995)

Mécanisme (suite)

- La «thérapie thrombolytique» avec des agents tels que la streptokinase ou les activateurs tissulaires du plasminogène tels que l'atelpase est souvent utilisée dans les 12 premières heures suivant l'apparition des symptômes pour essayer de lyser un thrombus récemment formé. Une telle thérapie avec lyse du thrombus peut rétablir le flux sanguin dans la majorité des cas. Cela aide à prévenir les lésions myocardiques importantes, si tôt au cours des événements, et peut au moins aider à réduire les dommages. (Kumar et Cannon, partie II, 2009)

Infarctus du myocarde

La pathogenèse peut inclure :

- Thrombus intracoronaire occlusif - un thrombus recouvrant une plaque provoque 75% des infarctus du myocarde, avec une érosion superficielle de la plaque présente dans les 25% restants.

- Vasospasme - avec ou sans athérosclérose coronaire et association possible avec l'agrégation plaquettaire.

- Embolies - à partir d'une thrombose murale du côté gauche, d'une endocardite ou d'embolies paradoxales du côté droit du cœur à travers un foramen ovale perméable.

En 2000, la Société européenne de cardiologie et le groupe de consensus de l'American College of Cardiology ont redéfini l'infarctus du myocarde, la définition étant basée sur la nécrose myocytaire déterminée par les troponines dans le contexte clinique de l'ischémie. (White and Chew, 2008)

- Les événements moléculaires pendant l'IM sont liés à l'événement ischémique initial, à la reperfusion et à la réponse inflammatoire subséquente. Jusqu'à 6 heures après l'événement ischémique initial, la plupart des pertes cellulaires se produisent par apoptose. Après cela, la nécrose prédomine. Les cellules endothéliales ischémiques expriment des molécules d'adhésion qui attirent les neutrophiles qui migrent ensuite dans le myocarde endommagé.
- L'aspect morphologique macroscopique d'un infarctus du myocarde peut varier. Les modèles incluent:

  - **Infarctus transmural** - impliquant toute l'épaisseur de la paroi ventriculaire gauche de l'endocarde à l'épicarde, généralement la paroi libre antérieure et la paroi libre postérieure et le septum avec extension dans la paroi VD dans 15-30%. Les infarctus isolés du VD et de l'oreillette droite sont extrêmement rares.

  - **Infarctus sous-endocardique** - zones multifocales de nécrose confinées au 1/3 ou ½ intérieur de la paroi ventriculaire gauche. Ceux-ci ne montrent pas la même évolution des changements observés dans un IM transmural

Les changements morphologiques macroscopiques évoluent avec le temps comme suit:

Temps depuis le début	Constatation morphologique brute
18-24 heures	Pâleur du myocarde
24 - 72 heures	Pâleur avec une certaine hyperhémie
3-7 jours	Bordure hyperhémique avec jaunissement central
10-21 jours	Maximalement jaunâtre avec des marges vasculaires
7 semaines	Fibrose blanchâtre

Les changements morphologiques microscopiques évoluent avec le temps comme suit:

Temps depuis le début	Découverte morphologique microscopique
1 - 3 heures	Fibres myocardiques ondulées mais pas de cellules inflammatoires
2-3 heures	Défaut de coloration du cytoplasme des fibres myocardiques avec du tétrazolium ou un colorant basique de fuchsine
4 - 12 heures et	Nécrose de coagulation avec perte de stries, œdème, hémorragie infiltrat neutrophile précoce
18-24 heures de	Nécrose de coagulation continue, pycnose des noyaux et bandes contraction marginales
24 - 72 heures	Perte totale de noyaux et stries avec infiltrat neutrophile important
3-7 jours	Début des infiltrations macrophages et mononucléaires, début de la réponse fibrovasculaire
10-21 jours proéminent	Réponse fibrovasculaire avec un tissu de granulation contenant des capillaires et des fibroblastes
7 Semaines	Fibrose avec tissu conjonctif collagène dense et sans inflammation

Les changements macroscopiques et microscopiques ci-dessus au fil du temps peuvent varier. En général, un plus grand infarctus évoluera à travers ces changements plus lentement qu'un petit infarctus. Les complications cliniques de l'infarctus du myocarde dépendront de la taille et de l'emplacement de l'infarctus,
ainsi que des dommages myocardiques préexistants.

Les complications peuvent inclure:

- Arythmies et troubles de conduction, avec "mort subite" possible
- Extension de l'infarctus ou ré-infarctus
- Insuffisance cardiaque congestive (œdème pulmonaire)
- Choc cardiogénique
- Péricardite
- Thrombose murale, avec embolisation possible
- Rupture de la paroi myocardique, avec tamponnade possible
- Rupture du muscle papillaire, avec une éventuelle insuffisance valvulaire
- Formation d'anévrisme ventriculaire
- La mort subite survient dans l'heure qui suit l'apparition des symptômes. Une telle occurrence complique souvent les cardiopathies ischémiques. Ces patients ont tendance à souffrir d'athérosclérose coronarienne sévère (> 75% de rétrécissement de la lumière). Souvent, une complication telle qu'une thrombose coronaire ou une hémorragie ou une rupture de plaque s'est produite. Le mécanisme de la mort est généralement une arythmie.

Bibliographie

1- https://webpath.med.utah.edu/ATHHTML/ATHIDX.html#4

2- Anversa P, Sonnenblick EH. Cardiomyopathie ischémique: mécanismes physiopathologiques. Prog Cardiovasc Dis. 1990; 33: 49-70.

3- Anversa P, Kajstura J, Reiss K, et al. Cardiomyopathie ischmique: perte de cellules myocytaires, hypertrophie myocytaire et hyperplasie cellulaire myocytaire. Ann NY Acad Sci. 1995; 752: 47-64.

4- Chattington P, Clarke D, Neithercut WD. Analyse séquentielle temporelle de la créatine kinase dans le diagnostic de l'infarctus du myocarde chez les patients de plus de 65 ans. J Clin Pathol. 1994; 47: 995-998.

5- Kumar A, Cannon CP. Syndromes coronariens aigus: diagnostic et prise en charge, partie I. Mayo Clin Proc. 2009; 84: 917-938.

6- Kumar A, Cannon CP. Syndromes coronariens aigus: diagnostic et prise en charge, partie II. Mayo Clin Proc. 2009; 84: 1021-1036.

7- Kost GJ, Kirk D, Omand K. Une stratégie pour l'utilisation de marqueurs de lésions cardiaques dans le diagnostic de l'infarctus aigu du myocarde. Arch Pathol Lab Med. 1998; 122: 245-251.

8- Mueller C. Biomarqueurs et syndromes coronariens aigus: une mise à jour. Eur Heart J. 2014; 35 (9): 552-556.

9- Otsuka F, Yasuda S, Noguchi T, Ishibashi-Ueda H. Pathologie de l'athérosclérose coronarienne et de la thrombose. Cardiovasc Diagn Ther. 2016; 6 (4): 396-408.

10- Saenger AK, Jaffe AS. L'utilisation de biomarqueurs pour l'évaluation et le traitement des patients atteints de syndromes coronariens aigus. Med Clin North Am. 2007; 91: 657-681.

11- Blanc HD, Chew DP. Infarctus aigu du myocarde. Lancette. 2008; 372: 570-584.

JE VOUS REMERCIE POUR VOTRE ATTENTION

BON COURAGE

PORTEZ VOUS BIEN

ET AU PLAISIR DE VOUS REVOIR TOUS ET TOUTES EN BONNE SANTE

Dr Houssam Bouakline

Email : fatihoussam@live.com

SAHA RAMDHANKOUM