

Correction de l'exercice

Aux urgences hospitalières, les médecins s'affairent autour d'un patient victime d'un traumatisme (du crâne) ***crânien** sévère et d'un autre qui présente une embolie (du poumon) ***pulmonaire** massive qui menace son pronostic vital,

lorsqu'ils sont prévenus de l'arrivée imminente d'un patient souffrant d'un enfoncement de la cage (du thorax) ***thoracique** et d'un autre,

envoyé par son médecin traitant pour symptôme de dilatation des voies (du foie) ***hépatiques** entraînant une inflammation de la vésicule (contenant de la bile) ***biliaire**.

Allongé dans le couloir un homme souffrant de migraines attend que ses (douleurs de la tête) ***céphalées** cèdent grâce au traitement qui lui a été administré par injection (dans le muscle) ***intramusculaire**.

Pendant ce temps, un enquêteur prend les empreintes (des doigts) ***digitales** d'un chauffard

tout en interrogeant un blessé léger, témoin (de l'œil) ***oculaire** de l'accident.

Ce dernier ne présente qu'une plaie (de la lèvre) ***labiale** qui nécessite une exploration rigoureuse et

une autre de l'arcade (du sourcil) ***sourcilière** qu'il faudra suturer. Bien sûr, il présente également quelques

lésions (de la peau) ***cutanées**, mais sans gravité.

Alors que se présente à l'accueil un boxeur au visage tuméfié et une suspicion de fracture (de la mâchoire) du ***maxillaire** inférieur, les pompiers font leur entrée

avec un jeune motard renversé par une voiture qui souffre d'une fracture ouverte de la diaphyse (du fémur) ***fémorale** droite,

de douleurs (du ventre) ***abdominales** diffuses,

Le ventre = l'abdomen -> douleurs abdominales.

et dont la tension (des artères) ***artérielle** chute, faisant penser à une possible hémorragie interne. Dirigé immédiatement vers le scanner, il sera opéré une demi-heure plus tard et sauvé.

Quelle garde mouvementée !