Réponses de neurologie

Question 1 :	***J'ai pas compris le test de Lancaster?***
Réponse 2 :	Le test de Lancaster est un examen complémentaire en ophtalmologie utile pour le diagnostic des parésies oculomotrices minimes responsables d'une diplopie ; il permet de déterminer le ou les muscles oculomoteurs atteints.
Dr Bahmani A.	Sémiologie des nerfs crâniens
Question 2 :	***Comment une lésion du tract optique va donne HLH g ?***
Réponse 2 :	Une hémianopsie latérale homonyme gauche (hémichamp temporal de l'œil gauche et hémichamp nasal de l'œil droit) est un trouble du champ visuel secondaire à une atteinte de la bandelette optique droite ; ceci s'explique par la disposition des axones de la bandelette optique droite qui sont issus d'un côté de la rétine temporale de l'œil droit responsable du champ nasal et de l'autre côté de la rétine nasale de l'œil gauche responsable du champ temporal. Se référer à l'anatomie des voies visuelles.  **Localisation de la lésion en fonction de l'atteinte du champ visuel.** **A.** Scotome central de l'oeil gauche par atteinte du faisceau maculaire de l'oeil gauche. **B.** Cécité unilatérale gauche totale par lésion complète du nerf optique gauche. **C.** Hémianopsie latérale droite de l'oeil gauche par compression latérale du chiasma. **D.** Hémianopsie bitemporale par lésion chiasmatique. **E.** Hémianopsie latérale homonyme droite par atteinte de la bandelette optique gauche. **F.** Quadranopsie latérale homonyme droite supérieure par atteinte des radiations optiques gauches inférieures. **G.** Quadranopsie latérale homonyme droite inférieure par atteinte des radiations optiques gauches supérieures. **H.** Hémianopsie latérale homonyme droite par atteinte du cortex occipital gauche. (Ce que le patient ne voit pas est représenté en noir.) (Source : CEN, 2019, illustration de Carole Fumat.)
Dr Bahmani A.	Sémiologie des nerfs crâniens